



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOE – SEPTIEMBRE 2012

MATEMÁTICAS II

INDICACIONES AL ALUMNO

1. Debe escogerse una sola de las opciones.
2. Debe exponerse con claridad el planteamiento de la respuesta o el método utilizado para su resolución. Todas las respuestas deben ser razonadas.
3. Entre corchetes se indica la puntuación máxima de cada apartado.
4. **No se permite el uso de calculadoras gráficas ni programables. Tampoco está permitido el uso de dispositivos con acceso a Internet.**

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. Considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ m & m^2 & m^2 \\ m & m & m^2 \end{pmatrix}$ con $m \in \mathbf{R}$.

a) [1 PUNTO] Halla para qué valores del parámetro m la matriz A es regular (invertible).

b) [1,5 PUNTOS] Estudia para qué valores del parámetro m el sistema $A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ tiene solución.

c) [0,75 PUNTOS] Para $m = 1$, calcula las soluciones del sistema dado en el apartado anterior.

2. Considera la función: $f(x) = |x^2 - 1|$

a) [1,25 PUNTOS] Estudia la derivabilidad de la función f .

b) [1,25 PUNTOS] Calcula los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f . Dibuja su gráfica.

c) [1 PUNTO] Calcula el área de la región limitada por la gráfica de la función f , el eje de abscisas ($y = 0$) y las rectas verticales $x = -1$ y $x = 1$.

3. Considera los puntos $A = (1,1,-1)$, $B = (0,3,1)$ y $C = (2, m-2, -3)$.

a) [1,25 PUNTOS] Determina para qué valor del parámetro m los tres puntos A, B y C están alineados y calcula las ecuaciones paramétricas de la recta que los contiene.

b) [1,25 PUNTOS] Determina los valores del parámetro m para los que el área del triángulo de vértices A, B y C es igual a $\frac{\sqrt{5}}{2}$ unidades de superficie.

c) [0,75 PUNTOS] Para $m = 0$, calcula la ecuación general del plano que contiene a los puntos A, B y C .

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. Considera las matrices $A = \begin{pmatrix} x & y \\ y & z \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} -4 & -12 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

a) [2,25 PUNTOS] Determina la matriz A que verifica: $\det(A) = -7$ y $A \cdot B = C$.

b) [1 PUNTO] Sean A, B, C las matrices dadas arriba y que verifican las condiciones del apartado anterior. Decide cuál de las igualdades siguientes se cumple. Justifica tu respuesta.

$$\text{(b-1)} \quad A = C \cdot B^{-1} \quad \text{(b-2)} \quad B = A^{-1} \cdot C \quad \text{(b-3)} \quad A^{-1} = B \cdot C^{-1}$$

2.

a) Considera la función $g(x) = \frac{ax^2 + b}{x-1}$ definida para $x \neq 1$.

a-1) [1,25 PUNTOS] Calcula los valores de a y b para que la gráfica de g pase por el punto $(2,2)$ y tenga una asíntota oblicua de pendiente 1.

a-2) [1,25 PUNTOS] Para $a = 1$ y $b = 1$, calcula la ecuación de la recta tangente a la gráfica de g en el punto de abscisa $x = -1$.

b) [1 PUNTO] Determina si la función $f(x) = x|x|$ es derivable en $x = 0$.

3. Considera la recta $r \equiv \begin{cases} 3x + 2y - z - 1 = 0 \\ x + y - 1 = 0 \end{cases}$

a) [1,25 PUNTOS] Determina la ecuación de la recta s que corta perpendicularmente a la recta r y que pasa por el punto $P = (0,2,2)$.

b) [0,75 PUNTOS] Halla el punto Q dado por la intersección de las rectas r y s .

c) [1,25 PUNTOS] Calcula la ecuación general del plano π que contiene a las rectas r y s , y la ecuación de la recta r_1 perpendicular al plano π y que pasa por el punto Q .